

**Mathematik II für Physiker und Geowissenschaftler
 SoSe 2007 Blatt 13 (Aufgaben 13.1 - 13.4)**

Abgabe in den Übungen am 11.7.07

Aufgabe 13.1 (Extrema unter Nebenbedingungen)

- a) Bestimme die Extrema der Funktion $f(x, y, z) := x + z$ unter der Nebenbedingung $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
- b) Berechne das maximale Volumen eines Quaders $V(x) = xyz$ mit einer Oberfläche $2(xy + xz + yz) = 10 \text{ m}^2$.
- c) Bestimme die Extremwerte von $f(x, y, z) = x + y + z$ unter den Bedingungen $x^2 + y^2 = 2$, $x + z = 1$.

(4 Punkte)

Aufgabe 13.2 (Implizite Funktionen)

Zeige: in der Nähe des Punktes $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ lassen sich die Gleichungen $xu + yvu^2 = 2$, $xu^3 + y^2v^4 = 2$ für u und v als Funktionen von x und y eindeutig lösen. Berechne $\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1)$.

(4 Punkte)

Aufgabe 13.3 (Koordinatentransformation)

- a) Zeige, dass die Divergenz eines Vektorfeldes $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ in Zylinderkoordinaten (Basis: (e_r, e_ϑ, e_z)) gegeben ist durch

$$\nabla \cdot F = \frac{1}{r} \left\{ \frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{\partial F_\vartheta}{\partial \vartheta} + \frac{\partial}{\partial z}(rF_z) \right\},$$

wobei $F = F_r e_r + F_\vartheta e_\vartheta + F_z e_z$.

- b) Zeige, dass die zweidimensionale Laplace-Gleichung $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ in Polarkoordinaten (r, ϑ) folgende Form hat:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \vartheta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0.$$

(4 Punkte)

Aufgabe 13.4 (Mehrfache Integrale)

a) Berechne die iterierten Integrale (ab Teil v) ist $D := [0, 1] \times [0, 1]$

i) $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^4 y + y^2) dy dx$ ii) $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 (y \cos x + 2) dy dx$

iii) $\int_{-1}^0 \int_1^2 (-x \ln y) dy dx$ iv) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \cos x \sin y dx dy$

v) $\int_D (xy e^{x^2 y}) dy dx$ vi) $\int_D (x^3 + y^2) dy dx$

vii) $\int_D y e^{xy} dy dx$ viii) $\int_D \ln \frac{x+1}{y+1} dy dx$

(4 Punkte)

b) i) Sei $D := \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq (a^2 - x^2)^{1/2}\}$ der im ersten Quadranten gelegene Teil der Scheibe mit dem Radius a . Berechne

$$\int_D (a^2 - y^2)^{1/2} dy dx .$$

ii) Berechne mit Hilfe von Kugelkoordinaten im \mathbb{R}^3 :

$$\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} dy \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dz \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} .$$

(4 Punkte)